

报价表（标段三）

序号	试剂名称	规格型号	所投产品品牌、型号	所投产品技术参数	报价
1	EV71/CA16/EV 三通道核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	20-50 人份/盒	广州达安，大包装，10 人份/盒；大包装，48 人份/盒；单管单人份，10 人份/盒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。 2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。 3. 阴阳性符合率：100%。 4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。 5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。 7. 稳定性好，效期可达 12 个月。 8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。 	15 元/通道/人份
2	柯萨奇病毒 A6/A10 型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）	20-50 人份/盒	广州达安，25 人份/盒，50 人份/盒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。 2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。 3. 阴阳性符合率：100%。 4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。 5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。 7. 稳定性好，效期可达 12 个月。 	18 元/通道/人份

				8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。	
3	EV71/CA16/CA6/CA10 四通道核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)	20-50 人份/盒	广州达安, 25 人份/盒, 50 人份/盒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。 2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。 3. 阴阳性符合率：100%。 4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。 5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。 7. 稳定性好，效期可达 12 个月。 8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。 	17 元/通道/人份
4	肠道病毒 71 型核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	20-50 人份/盒	广州达安, 24 人份/盒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。 2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。 3. 阴阳性符合率：100%。 4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。 5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。 7. 稳定性好，效期可达 12 个月。 	15 元/通道/人份

				8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。	
5	柯萨奇病毒 A16 型 核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针 法)	20-50 人 份/盒	广州达安, 24 人份/盒	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	15 元/通道/人份
6	柯萨奇病毒 A6 型 核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针 法)	20-50 人 份/盒	广州达安, 大包装：10 人份/盒、48 人份/盒；单 管单人份： 10 人份/盒	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、</p>	15 元/通道/人份

				全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。	
7	柯萨奇病毒 A10 型 核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针 法)	20-50 人 份/盒	广州达安, 大包装: 10 人份/盒、48 人份/盒; 单 管单人份: 10 人份/盒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测原理: 荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。 2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。 3. 阴阳性符合率: 100%。 4. 精密度: Ct 变异系数不高于 5%。 5. 特异性好, 与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标, 可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。 7. 稳定性好, 效期可达 12 个月。 8. 适用样本类型包括: 口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。 	15 元/通道/人份
8	肠道病毒通用型 核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针 法)	20-50 人 份/盒	广州达安, 24 人份/盒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测原理: 荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。 2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。 3. 阴阳性符合率: 100%。 4. 精密度: Ct 变异系数不高于 5%。 5. 特异性好, 与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标, 可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。 7. 稳定性好, 效期可达 12 个月。 8. 适用样本类型包括: 口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。 	15 元/通道/人份

9	柯萨奇病毒 A2 型 核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针 法)	20-50 人 份/盒	广州达安, 25 人份/盒, 50 人份/盒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测原理: 荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。 2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。 3. 阴阳性符合率: 100%。 4. 精密度: Ct 变异系数不高于 5%。 5. 特异性好, 与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标, 可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。 7. 稳定性好, 效期可达 12 个月。 8. 适用样本类型包括: 口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。 	18 元/通道/人份
10	柯萨奇病毒 A4 型 核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针 法)	20-50 人 份/盒	广州达安, 25 人份/盒, 50 人份/盒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测原理: 荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。 2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。 3. 阴阳性符合率: 100%。 4. 精密度: Ct 变异系数不高于 5%。 5. 特异性好, 与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标, 可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。 7. 稳定性好, 效期可达 12 个月。 8. 适用样本类型包括: 口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。 	18 元/通道/人份

11	柯萨奇病毒 A5 型 核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针 法)	20-50 人 份/盒	广州达安, 25 人份/盒, 50 人份/盒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测原理: 荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。 2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。 3. 阴阳性符合率: 100%。 4. 精密度: Ct 变异系数不高于 5%。 5. 特异性好, 与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标, 可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。 7. 稳定性好, 效期可达 12 个月。 8. 适用样本类型包括: 口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。 	18 元/通道/人份
12	发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒核酸定量检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	20-50 人 份/盒	广州达安, 48 人份/盒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测原理: 荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。 2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。 3. 阴阳性符合率: 100%。 4. 精密度: Ct 变异系数不高于 5%。 5. 特异性好, 与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标, 可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。 7. 稳定性好, 效期可达 12 个月。 8. 适用样本类型包括: 口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。 	18 元/通道/人份
13	麻疹病毒/风疹病	20-50 人	广州达安,	1. 检测原理: 荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。	18 元/通

	毒双通道核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	份/盒	25 人份/盒, 50 人份/盒	<p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率: 100%。</p> <p>4. 精密度: Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好, 与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标, 可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好, 效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括: 口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	道/人份
14	登革热病毒核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	20-50 人份/盒	<p>广州达安, 大包装: 10 人份/盒、48 人份/盒; 单管单人份: 10 人份/盒</p>	<p>1. 检测原理: 荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率: 100%。</p> <p>4. 精密度: Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好, 与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标, 可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好, 效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括: 口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	15 元/通道/人份
15	鹦鹉热衣原体核酸检测试剂盒	20-50 人份/盒	广州达安, 25 人份/盒,	<p>1. 检测原理: 荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等</p>	18 元/通道/人份

	(PCR-荧光探针法)		50 人份/盒	<p>荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	
16	猴痘病毒核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	20-50 人份/盒	<p>广州达安，</p> <p>25 人份/盒，</p> <p>50 人份/盒</p>	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	18 元/通道/人份
17	人腺病毒 B 亚属/C 亚属/E 亚属三通道核酸检测试剂	20-50 人份/盒	<p>广州达安，</p> <p>25 人份/盒，</p> <p>50 人份/盒</p>	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p>	18 元/通道/人份

	盒 (PCR-荧光探针法)			<p>3. 阴阳性符合率: 100%。</p> <p>4. 精密度: Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好, 与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标, 可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好, 效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括: 口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	
18	解脲脲原体核酸检测试剂盒 (PCR 荧光探针法)	20-50 人份/盒	<p>广州达安, 单管单人份, 20 人份/盒; 大包装, 20 人份/盒</p>	<p>1. 检测原理: 荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率: 100%。</p> <p>4. 精密度: Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好, 与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标, 可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好, 效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括: 口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	10 元/通道/人份
19	单纯疱疹病毒 II 型核酸测定试剂盒 (PCR-荧光探针法)	20-50 人份/盒	<p>广州达安, 单管单人份, 20 人份/盒; 大包装,</p>	<p>1. 检测原理: 荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率: 100%。</p>	10 元/通道/人份

			20 人份/盒	<p>4. 精密度: Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好, 与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标, 可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好, 效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括: 口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	
20	淋球菌核酸测定试剂盒 (PCR-荧光探针法)	20-50 人份/盒	<p>广州达安, 单管单人份, 20 人份/盒; 大包装, 20 人份/盒</p>	<p>1. 检测原理: 荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率: 100%。</p> <p>4. 精密度: Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好, 与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标, 可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好, 效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括: 口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	10 元/通道/人份
21	沙眼衣原体核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	20-50 人份/盒	<p>广州达安, 单管单人份, 20 人份/盒; 大包装, 20 人份/盒</p>	<p>1. 检测原理: 荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率: 100%。</p> <p>4. 精密度: Ct 变异系数不高于 5%。</p>	10 元/通道/人份

				<p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	
22	水痘-带状疱疹病毒核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法)	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	18 元/通道/人份
23	沙门氏菌核酸检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似</p>	18 元/通道/人份

				<p>的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	
24	副溶血性弧菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	18 元/通道/人份
25	金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p>	18 元/通道/人份

				<p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	
26	单核细胞增生李斯特菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密性：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	18 元/通道/人份
27	A 族链球菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密性：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性</p>	18 元/通道/人份

				<p>内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	
28	百日咳鲍特菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	18 元/通道/人份
29	艰难梭菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采</p>	18 元/通道/人份

				<p>样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	
30	<p>肠炎沙门菌核酸 检测试剂盒（荧光 PCR 法）</p>	<p>20-50 人 份/盒</p>	<p>广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒</p>	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	<p>18 元/通 道/人份</p>
31	<p>嗜肺军团菌核酸 检测试剂盒（荧光 PCR 法）</p>	<p>20-50 人 份/盒</p>	<p>广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒</p>	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p>	<p>18 元/通 道/人份</p>

				<p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	
32	创伤弧菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	18 元/通道/人份
33	阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p>	18 元/通道/人份

				8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。	
34	空肠弯曲菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。 2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。 3. 阴阳性符合率：100%。 4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。 5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。 7. 稳定性好，效期可达 12 个月。 8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。 	18 元/通道/人份
35	蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。 2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。 3. 阴阳性符合率：100%。 4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。 5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。 7. 稳定性好，效期可达 12 个月。 8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。 	18 元/通道/人份

				全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。	
36	唐菖蒲伯克霍尔德菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	18 元/通道/人份
37	志贺菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<p>1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。</p> <p>2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。</p> <p>3. 阴阳性符合率：100%。</p> <p>4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。</p> <p>5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。</p> <p>6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。</p> <p>7. 稳定性好，效期可达 12 个月。</p> <p>8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。</p>	18 元/通道/人份

38	小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。 2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。 3. 阴阳性符合率：100%。 4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。 5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。 7. 稳定性好，效期可达 12 个月。 8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。 	18 元/通道/人份
39	肉毒毒素核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）	20-50 人份/盒	广州达安， 25 人份/盒， 50 人份/盒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检测原理：荧光 PCR 法检测病毒 DNA 或 RNA。 2. 适用仪器包括伯乐 CFX96、ABI7500、宏石等荧光定量 PCR 仪。 3. 阴阳性符合率：100%。 4. 精密度：Ct 变异系数不高于 5%。 5. 特异性好，与感染部位相同或感染症状相似的其他病原体无交叉反应。 6. 标注有“含内标”的试剂种类要求带内源性内标，可检测反应全过程和一定程度上反应采样质量。 7. 稳定性好，效期可达 12 个月。 8. 适用样本类型包括：口咽拭子、鼻咽拭子、全血或皮疹、痂皮、水疱液、脓疱液等。 	18 元/通道/人份

标段三清单合计报价（人民币大写：陆佰肆拾捌元整）

648.00元

供应商：南京恒科生物科技有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：



[Handwritten signature]

日期：2024.4.15